Esempio : giostra in rotazione

assumendo:

- che all'istante iniziale il punto P sia posto nel centro O' del sistema fisso S'

$$\Rightarrow \vec{r}_{A_P} = \mathbf{0}$$

- che P sia fisso al passar del tempo rispetto all'osservatore solidale con S'

$$\Rightarrow \vec{V}_{A_P} = \mathbf{0} \quad \text{e} \quad \vec{a}_{A_P} = \mathbf{0}$$

- che l'asse di rotazione della giostra coincida con il centro del sistema mobile S

e che l'origine di S rimanga fissa nel tempo rispetto all'origine del sistema fisso S'

$$\text{ossia che si abbia } \vec{r}_{A_O} = \text{costante} \Rightarrow \vec{V}_{A_O} = \mathbf{0} \quad \text{e} \quad \vec{a}_{A_O} = \mathbf{0}$$

- che la velocità di rotazione della giostra sia costante $\Rightarrow \dot{\vec{\omega}} = \mathbf{0}$

- che O e O' siano posti alla stessa altezza rispetto al suolo

determinare la velocità e l'accelerazione di P rispetto al centro della giostra

in questo caso il vettore omega $\vec{\omega} = \omega_x \hat{i} + \omega_y \hat{j} + \omega_z \hat{k}$ e' diretto verso l'alto in S

quindi sara' $\vec{\omega} = 0\hat{i} + 0\hat{j} + \left(\frac{d\hat{i}}{dt} \cdot \hat{j} \right) \hat{k}$

dato che $\omega_x = \frac{d\hat{j}}{dt} \cdot \hat{k}$ $\omega_y = \frac{d\hat{k}}{dt} \cdot \hat{i}$ $\omega_z = \frac{d\hat{i}}{dt} \cdot \hat{j}$

e che in generale si ha $\frac{d\hat{u}}{dt} = \frac{d\mathcal{G}}{dt} \hat{n}$

dove $\frac{d\mathcal{G}}{dt}$ e' la rapidita' con cui ruota il versore $\hat{u}$ (la velocita' angolare di $\hat{u}$)

in questo caso $\hat{u} \equiv \hat{i}$ e il versore $\hat{n}$ coincide con il versore $\hat{j}$

$\frac{d\hat{i}}{dt} = \frac{d\mathcal{G}}{dt} \hat{j}$ e $\left(\frac{d\hat{i}}{dt} \cdot \hat{j} \right) = \frac{d\mathcal{G}}{dt} \hat{j} \cdot \hat{j} = \frac{d\mathcal{G}}{dt}$

in conclusione: $\vec{\omega} = 0\hat{i} + 0\hat{j} + \frac{d\mathcal{G}}{dt} \hat{k} \Rightarrow \vec{\omega} = \frac{d\mathcal{G}}{dt} \hat{k}$

le equazioni generali di trasformazione sono:

$$\vec{r}_{A_P} = \vec{r}_{R_P} + \vec{r}_{A_O}$$

$$\vec{V}_{A_P} = \vec{V}_{R_P} + \vec{V}_{A_O} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P}$$

$$\vec{a}_{A_P} = \vec{a}_{R_P} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}_{R_P} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P}) + \vec{a}_{A_O} + 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{R_P}$$

► imponendo le condizioni al contorno $\vec{r}_{A_P} = 0$ $\vec{V}_{A_P} = 0$ $\vec{V}_{A_O} = 0$

$\vec{a}_{A_P} = 0$ $\dot{\vec{\omega}} = 0$ e $\vec{a}_{A_O} = 0$ si ha

$$0 = \vec{r}_{R_P} + \vec{r}_{A_O} \Rightarrow \vec{r}_{R_P} = -\vec{r}_{A_O}$$

$$0 = \vec{V}_{R_P} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P} \Rightarrow \vec{V}_{R_P} = -\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P}$$

$$0 = \vec{a}_{R_P} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P}) + 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{R_P}$$

$$\Rightarrow \vec{a}_{R_P} = -\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P}) - 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{R_P}$$

$$\vec{a}_{R_P} = -\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P}) - 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{R_P}$$

↓

si e' trovato che $\vec{V}_{R_P} = -\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P}$

$$-\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P}) + 2\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P})$$

↓

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P})$$

$\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}$

↓

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

$$(\vec{\omega} \cdot \vec{r}_{R_P})\vec{\omega} - (\vec{\omega} \cdot \vec{\omega})\vec{r}_{R_P}$$

↓

$(\vec{\omega} \cdot \vec{r}_{R_P}) = 0$ dato che $\vec{\omega}$ e' perpendicolare a $\vec{r}_{R_P}$

$$0 - (\vec{\omega} \cdot \vec{\omega})\vec{r}_{R_P} = -\omega^2 \vec{r}_{R_P}$$

in conclusione $\vec{a}_{R_P} = -\omega^2 \vec{r}_{R_P}$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{R_P}) \equiv ? \omega^2 \vec{r}_{R_P}$$

$$\vec{a}_{R_P} = -\omega^2 \vec{r}_{R_P}$$

discussione del segno meno

punto di vista di S'

l'osservatore posto in O' e' solidale con S' e vede S' fermo, e quindi P , fermo dunque sostiene che sia il sistema S a ruotare attorno ad un asse fisso

punto di vista di S

l'osservatore posto in O e' solidale con S e vede S fermo dunque sostiene che sia il sistema S' , e quindi P , a ruotare attorno ad O lungo una traiettoria circolare e questo comporta la presenza di una accelerazione centripeta

Attenzione: le relazioni vettoriali hanno validita' intrinseca ossia sono vere

qualunque sistema di riferimento si scelga, ma le relazioni tra le componenti

dei vettori non sono indipendenti dal sistema di riferimento

ad es. la relazione vettoriale $\vec{r}_{P_A} = \vec{r}_{P_R} + \vec{r}_{O_A}$ ossia la

$$x' \hat{i}' + y' \hat{j}' + z' \hat{k}' = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k} + x'_o \hat{i}' + y'_o \hat{j}' + z'_o \hat{k}'$$

o piu' esplicitamente :

$$x_{A_P} \hat{i}' + y_{A_P} \hat{j}' + z_{A_P} \hat{k}' = x_{R_P} \hat{i} + y_{R_P} \hat{j} + z_{R_P} \hat{k} + x_{A_O} \hat{i}' + y_{A_O} \hat{j}' + z_{A_O} \hat{k}'$$

$$x_{A_P} \hat{i}' = x_{R_P} \hat{i} + x_{A_O} \hat{i}'$$

implica che $y_{A_P} \hat{j}' = y_{R_P} \hat{j} + y_{A_O} \hat{j}'$

$$z_{A_P} \hat{k}' = z_{R_P} \hat{k} + z_{A_O} \hat{k}'$$

se S ed S' avessero gli assi **paralleli**

$$\rightarrow \hat{i} \equiv \hat{i}' \quad \hat{j} \equiv \hat{j}' \quad \hat{k} \equiv \hat{k}'$$

le

$$x_{A_P} \hat{i}' = x_{R_P} \hat{i} + x_{A_O} \hat{i}'$$

$$y_{A_P} \hat{j}' = y_{R_P} \hat{j} + y_{A_O} \hat{j}'$$

$$z_{A_P} \hat{k}' = z_{R_P} \hat{k} + z_{A_O} \hat{k}'$$

diverrebbero

$$x_{A_P} \hat{i}' = x_{R_P} \hat{i}' + x_{A_O} \hat{i}' \quad \Rightarrow \quad x_{A_P} = x_{R_P} + x_{A_O}$$

$$y_{A_P} \hat{j}' = y_{R_P} \hat{j}' + y_{A_O} \hat{j}' \quad \Rightarrow \quad y_{A_P} = y_{R_P} + y_{A_O}$$

$$z_{A_P} \hat{k}' = z_{R_P} \hat{k}' + z_{A_O} \hat{k}' \quad \Rightarrow \quad z_{A_P} = z_{R_P} + z_{A_O}$$

quindi se S ed S' avessero gli assi **paralleli** la relazione vettoriale

$\vec{r}_{A_P} = \vec{r}_{R_P} + \vec{r}_{A_O}$ implicherebbe tre semplici relazioni per le proiezioni sugli assi ossia che

$$x_{A_P} = x_{R_P} + x_{A_O}$$

$$y_{A_P} = y_{R_P} + y_{A_O}$$

$$z_{A_P} = z_{R_P} + z_{A_O}$$

ma se i due sistemi fossero ruotati uno rispetto all'altro

$$x_{A_P} \hat{i}' = x_{R_P} \hat{i} + x_{A_O} \hat{i}' \quad \text{non implicherebbe che}$$

$$x_{A_P} = x_{P_R} + x'_{A_O}$$

perche' in questo caso $\hat{i} \neq \hat{i}'$ e analogamente

$$\text{per le relazioni } y_{A_P} \hat{j}' = y_{R_P} \hat{j} + y_{A_O} \hat{j}' \quad \text{e} \quad z_{A_P} \hat{k}' = z_{R_P} \hat{k} + z_{A_O} \hat{k}'$$

per semplicità consideriamo un caso di rotazione solo rispetto all'asse z

e consideriamo il caso più semplice possibile in cui $\vec{r}_{A_O} = 0$

ossia il caso in cui le origini dei due sistemi di riferimento coincidano

se $\vec{r}_{A_O} = 0$ la $\vec{r}_{A_P} = \vec{r}_{R_P} + \vec{r}_{A_O}$ diviene $\vec{r}_{A_P} = \vec{r}_{R_P}$

il che significa che i due vettori posizione sono uguali

e ciò è evidente dall'animazione a fianco

e se $\vec{r}_{A_p} = \vec{r}_{R_p}$ si ha che $x_{A_p} \hat{i}' + y_{A_p} \hat{j}' + z_{A_p} \hat{k}' = x_{R_p} \hat{i} + y_{R_p} \hat{j} + z_{R_p} \hat{k}$

e questo implica che $x_{A_p} \hat{i}' = x_{R_p} \hat{i}$ $y_{A_p} \hat{j}' = y_{R_p} \hat{j}$ etc.

ma se gli assi sono ruotati cio' **non implica** che $x_{A_p} = x_{R_p}$ etc.

perche se gli assi sono ruotati il versore $\hat{i}'$ e' diverso da $\hat{i}$

il versore $\hat{j}'$ e' diverso da $\hat{j}$ etc.

se si moltiplicano scalarmente per $\hat{i}'$ ambo i membri della $\vec{r}_{A_p} = \vec{r}_{R_p}$

$$x_{A_p} \hat{i}' \cdot \hat{i}' + y_{A_p} \hat{j}' \cdot \hat{i}' + z_{A_p} \hat{k}' \cdot \hat{i}' = x_{R_p} \hat{i} \cdot \hat{i}' + y_{R_p} \hat{j} \cdot \hat{i}' + z_{R_p} \hat{k} \cdot \hat{i}'$$

dato che $\hat{i}' \cdot \hat{i}' = 1$ $\hat{i}' \cdot \hat{j}' = \hat{j}' \cdot \hat{i}' = 0$ e $\hat{i}' \cdot \hat{k}' = \hat{k}' \cdot \hat{i}' = 0$

$$\text{riesce } x_{A_p} = x_{R_p} \hat{i} \cdot \hat{i}' + y_{R_p} \hat{j} \cdot \hat{i}' + z_{R_p} \hat{k} \cdot \hat{i}'$$

$$x_{A_P} = x_{R_P} \hat{i} \cdot \hat{i}' + y_{R_P} \hat{j} \cdot \hat{i}' + z_{R_P} \hat{k} \cdot \hat{i}'$$

Nota bene : se si ha una rotazione attorno alla verticale l'asse z' concidera'

con l'asse z e $\hat{k} \cdot \hat{i}' \equiv \hat{k}' \cdot \hat{i} = 0$ quindi $x_{A_P} = x_{R_P} \hat{i} \cdot \hat{i}' + y_{R_P} \hat{j} \cdot \hat{i}'$

ma $\hat{i} \cdot \hat{i}' \neq 1$ e $\hat{j} \cdot \hat{i}' \neq 0$ dunque $x_{A_P} \neq x_{R_P}$

➤ quando si considerano sistemi ruotati tra loro la proiezione sull'asse x

(o su y , o su z) della posizione di un punto P come vista nel sistema fisso S'

non e' necessariamente uguale alla proiezione dello stesso punto P

dello spazio come vista dal sistema S

in caso di rotazione antioraria attorno all'asse z

se $\vec{r}_{A_0} = 0$ ossia se O e O' coincidono

$$\Rightarrow x_{A_0} = 0 \quad \text{e} \quad y_{A_0} = 0$$

per cui $x_{A_P} \hat{i}' = x_{R_P} \hat{i}$ e $y_{A_P} \hat{i}' = y_{R_P} \hat{i}$

$$x_{A_P} \equiv CO = BO' - BC = BO' - AH \Rightarrow x_{A_P} = x_{R_P} \cos(\alpha) - y_{R_P} \sin(\alpha)$$

$$y_{A_P} \equiv PC = HC + PH = AB + PH \Rightarrow y_{A_P} = x_{R_P} \sin(\alpha) + y_{R_P} \cos(\alpha)$$

in termini di versori $\hat{i}' \cdot \hat{i} = \cos(\alpha)$ e $\hat{i}' \cdot \hat{j} = -\sin(\alpha)$

in effetti $\hat{i}' \cdot \hat{j} = \cos(\beta)$ ma $\beta = 90 + \alpha$

$$\text{e} \quad \cos(90 + \alpha) = -\sin(\alpha)$$

il tutto e' piu' facilmente esprimibile in termini di prodotto di matrici

$$\begin{bmatrix} x_{A_p} \\ y_{A_p} \\ z_{A_p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\text{sen}(\alpha) & 0 \\ \text{sen}(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{R_p} \\ y_{R_p} \\ z_{R_p} \end{bmatrix}$$

rotazione attorno all'asse z

$$\mathbf{R}_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\text{sen}(\alpha) & 0 \\ \text{sen}(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

rotazione attorno all'asse y

$$\mathbf{R}_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos(\beta) & 0 & \text{sen}(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\text{sen}(\beta) & 0 & \cos(\beta) \end{bmatrix}$$

rotazione attorno all'asse x

$$\mathbf{R}_x(\gamma) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\gamma) & -\text{sen}(\gamma) \\ 0 & \text{sen}(\gamma) & \cos(\gamma) \end{bmatrix}$$

Backup Slides