

Fisica Generale LA

Prova Scritta del 12 Gennaio 2009

Prof. Nicola Semprini Cesari

Compito N. 2

Quesiti

- 1) Un sistema isolato è composto da due punti materiali di massa $m_1 = 2\text{ Kg}$ e $m_2 = 3\text{ Kg}$ che si muovono con velocità $\vec{v}_1 = (1, 2, 2)$ e $\vec{v}_2 = (0, -1, 1)$ calcolare il modulo della quantità di moto del sistema.
 - 2) Scrivere le equazioni cartesiane del moto di un punto materiale di massa m posto in un campo di forze che ha per energia potenziale $V(x, y, z) = -\alpha z^2$, sapendo che all'istante $t = 0$ il punto si trova in $(0, 0, z_0)$ con velocità $\vec{v}_0 = v_0 \vec{i}$. Risolvere le equazioni.
 - 3) Stabilire se il campo di forze $\vec{F}(x, y, z) = -\alpha y^2 \vec{i} - (2\alpha xy - \beta) \vec{j} + \beta \vec{k}$ è conservativo e calcolarne, eventualmente, la funzione energia potenziale. Determinare inoltre le dimensioni e le unità di misura delle costanti α e β .
 - 4) Enunciare e spiegare il significato della prima equazione cardinale della meccanica. Fare inoltre un esempio di applicazione di tale equazione.
-

Problema

Si consideri una asta omogenea di massa M e lunghezza L posta verticalmente e vincolata nel centro di massa. Ad un certo istante di tempo una pallina di massa $m = \frac{M}{6}$ e velocità iniziale \vec{v} diretta orizzontalmente urta l'asta a distanza $\frac{L}{4}$ dal centro di massa. Calcolare le espressioni delle seguenti quantità:

- a) il momento angolare del sistema;
- b) la velocità angolare dell'asta dopo l'urto nel caso in cui la pallina rimbalzi indietro con velocità in modulo pari a $\frac{v}{2}$.

Soluzioni compito 2

Quesito 1

$$\vec{P} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = 2(1, 2, 2) + 3(0, -1, 1) = (2, 1, 7) \quad |\vec{P}| = 3\sqrt{6} \text{ Kg m/s}$$

Quesito 2

$$\vec{F} = 2\alpha z \vec{k}, \quad \vec{v}_0 = v_0 \vec{i}, \quad \vec{r}_0 = z_0 \vec{k} \quad \ddot{x} = \ddot{y} = 0, \quad \ddot{z} - \frac{2\alpha}{m} z = 0$$

$$x(t) = v_0 t, \quad y(t) \equiv 0, \quad z(t) = \frac{z_0}{2} \left(e^{\sqrt{2\alpha/m} t} + e^{-\sqrt{2\alpha/m} t} \right)$$

Quesito 3

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = -2\alpha y = \frac{\partial F_y}{\partial x};$$

$$\frac{\partial F_x}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial x} = 0; \quad \text{il campo è conservativo}$$

$$\frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y} = 0;$$

Il campo è conservativo, avendo rotore nullo. Il potenziale U si ottiene integrando su un cammino a “zig-zag” tra l’origine e il punto generico $P(x, y, z)$:

$$V = -U = - \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \left(\int_{(0,0,0)}^{(x,0,0)} F_x dx + \int_{(x,0,0)}^{(x,y,0)} F_y dy + \int_{(x,y,0)}^{(x,y,z)} F_z dz \right) = -(-\alpha xy^2 + \beta y + \beta z) = \alpha xy^2 - \beta(y + z)$$

$$[\alpha] = [ML^{-1}T^{-2}] \Rightarrow \frac{N}{m^2} = Pa$$

$$[\beta] = [MT^{-2}] \Rightarrow \frac{N}{m}$$

Problema

$$a) \quad \vec{K} = \frac{\dot{L}}{4} \times m \vec{v} = \frac{1}{24} LM v \vec{k};$$

$$b) \quad K_{in} = \frac{1}{24} LM v;$$

$$K_{fin} = I\omega - \frac{1}{24} LM \frac{v}{2}; \quad I = \frac{1}{2} ML^2$$

$$I\omega = \frac{1}{24} LM v + \frac{1}{24} LM \frac{v}{2} = \frac{3}{24} LM \frac{v}{2} = \frac{1}{16} LM v;$$

$$\omega = \frac{1}{16} LM v \frac{2}{ML^2} = \frac{1}{8} \frac{v}{L}.$$